

Gorra frío Chemo 762-00NC1

Siga las recomendaciones del producto en el manual de instrucciones del fabricante, dependiendo de la duración de la aplicación.

La recomendación general del fabricante para el tratamiento de lesiones deportivas es solo de 20 minutos, **pero** el tiempo de tratamiento para la quimioterapia es claramente más largo (ver arriba).

El tiempo de enfriamiento de estos elementos refrigerantes es de hasta 90 minutos: las bolsas de gel frío liberan su capacidad de enfriamiento de manera uniforme y durante un período prolongado.

¿Cómo se utilizan? Recomendaciones de uso

Consejos y sugerencias

Entre las sesiones de quimioterapia, los elementos refrigerantes se guardan en el congelador (al menos 2 horas a -18 °C).

Posteriormente, pueden permanecer indefinidamente en el congelador y siguen siendo blandos y flexibles.

¿Cómo guardarlos en el congelador?

- En el envase original del fabricante.
- No poner en contacto con alimentos.

El día del tratamiento:

Coloque los elementos refrigerantes en una pequeña nevera portátil.

¿Cómo mantener el elemento frío más tiempo en la nevera portátil?

- Envuelva, por ejemplo, en una bolsa aislante, una toalla, una tela de franela, etc.

Aplicación durante la quimioterapia:

- Cabeza: eventualmente use un gorro quirúrgico desechable.
- Comience a enfriar la piel 10–15 minutos (o 30 minutos Referencia* 2) antes del inicio de la quimioterapia/infusión.
- Para la crioterapia, coloque una tela o material aislante entre la compresa fría y la piel.
- Capas intermedias adecuadas son: una toalla ligera, tela, una sábana/funda de almohada recortada, 6 capas de toallas de papel o una tela de punto.
La solución de infusión se administra por vía intravenosa (infusión por goteo).
- Mantenga el elemento refrigerante sobre la piel durante la quimioterapia.
- Después de la infusión, debe llevar el elemento refrigerante aún 10–15 minutos (o a veces 90 minutos Referencia* 2) después de la quimioterapia.

¿Ha traído su propio elemento refrigerante?

- Puede llevarlo consigo si tiene permiso. Tenga en cuenta que es posible que no se le permita conducir un coche usted mismo (manos, pies).
La duración exacta del tratamiento será determinada por el médico tratante.
La duración total depende, entre otras cosas, de la concentración o potencia del medicamento y de la rapidez con la que el medicamento sea eliminado por los riñones.

Si no tolera el frío:

- Coloque durante la aplicación un paño, toalla u otro material aislante entre la gorra y la piel.

Almacenamiento:

- Deje secar el elemento refrigerante antes de volver a colocarlo en el congelador.

En caso de dolor de cabeza/migraña:

- Normalmente basta con guardar el elemento refrigerante solo en el refrigerador.

Si tiene dudas, consulte a su médico tratante, oncólogo, personal de enfermería de planta o dermatólogo.

Nota:

- Cada vez que se aplica frío sobre la piel, aparece al principio dolor, lo cual es normal. Después de unos 10 minutos esto se convierte en una sensación de adormecimiento. Respete las indicaciones mencionadas arriba.
Todos los elementos refrigerantes sirven para enfriar.
Solo en el caso de los calcetines de hielo (no en las zapatillas de hielo) las bolsas de gel extraíbles también pueden utilizarse para la aplicación de calor.

Si necesita más información, quedo a su disposición.

Atentamente,

Hendrik Huyghelier

Servicio de atención al cliente Belgomedical

E.B. Materials bv

Kerkstraat 29/2

3540 Schuren

Bélgica

Tel: 0032 13 66 75 99 (Horario de atención telefónica: de 14:00 a 17:00 horas)

Hablamos inglés, francés, alemán y neerlandés. Envíanos tu pregunta a través del formulario de contacto.

<https://www.belgomedical.com/contact-5/>

También puedes hacerlo en tu propio idioma si es necesario. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

NIF-IVA: 0859589551

<https://www.belgomedical.com/store-5/>